

Neosetrujte plodiny poskodené škodcami, chorobami, alebo stresovaním; nedostatkom živín. Prípravok taktiež neaplikujte na vlhkosť; porast pri teplotách nižších ako 12 °C, resp. vyšších ako 25 °C, ďalej na veľmi; ruzne ...

Talisman je prípravok, ktorým rastlinu stimulujeme a vyživujeme zároveň. Tento synergický efekt sa vždy prejaví. Všeobecne pre všetky plodiny platia nasledovné pravidlá použitia: Pri detekcii abiotického stresu (stres z tepla: všeobecne v polných podmienkach SR; to teploty nad 30 °C, stres z chladu: prudký pokles teploty; noc; mraz; ky, prípadne ...

A VSETKO HR! Prípravok aplikujte pri objavení prvých znakov napadnutia, prípadne na základe signalizácie v priebehu vegetácie od začiatku zariadenia plodiny: 10% rastlín v riadku zapojených až do ...

Vo vinici osetrujte na základe signalizácie od rastovej fázy vyvinutého štvrťho listu (BBCH 14) do rastovej fázy začiatok dozrievania (BBCH 81). Aplikácia a objem vody odporúčané prispôbiť rastovej fáze vinice nasledovne: BBCH 14 (4 listy vyvinuté): 0,175 l/ha v max. 400 l vody/ha

ADAMA Global SK sk. Slovakia; Katalóg prípravkov na ochranu rastlín. Filter . Filtrovat podľa: Na profesionálne použitie a na širokú domáce pozemky. Krajiny. Kategória. Adjuvanty, regulátory rastu a biostimulanty (10) Fungicíd (22) Herbicíd (19) Insekticíd (6)

Find company research, competitor information, contact details & financial data for ADAME, s. r. o. of Lozorno, Bratislavský kraj. Get the latest business insights from Dun & Bradstreet.

Všeobecné informácie. Objavte nové praktické balenie pre komplexné POST odburinenie 20 hakukurice v zložených; COLTRANE 40 l + NICOGAN 40 OD 20 l určených; pre pestovateľov kukurice, ktorých; ocakávajú; spoľahlivý; komplexný; odburinenie kukurice, zahrňajúce riešenie dvojklonových burín, ako liskavce, podslnečník, ambrúziu, mrlík, rumany a ...

Fytotoxicita: Ak je prípravok MIRADOR UNI aplikovaný; v sádkach s platnou etiketou je tolerantný; k ošetrovaným rastlinám. Upozornenie: Prípravok MIRADOR UNI môže spôsobiť poškodenie jadrových, preto zabráňte letu postrekovej kvapaliny! Niektoré odrody jabloní; veľmi citlivé; na prípravok MIRADOR

UNI. Postrekovac, ktor&#253; bol pouzit&#253; na aplik&#225;ciu ...

Adjuvant vo forme emulgovatel&#233;ho koncentr&#225;tu urcen&#253; na zlep&#237;enie vlastnost&#237; postrekov&#253;ch kvapal&#237;n, zv&#253;senie a zr&#253;chlenie penetr&#225;cie pr&#237;pravkov do rastl&#237;n a zv&#253;senie biologickej &#250;cinnosti pestic&#237;dov, predovsetk&#253;m syst&#233;mov&#253;ch fungic&#237;dov.

MIRADOR sa pou&#237;va pred alebo na zaciatku v&#253;skytu choroby. V obilnin&#225;ch je mozn&#233; pr&#237;pravok aplikovat 1 x za sez&#243;nu. 1. Skors&#237; term&#237;n aplik&#225;cie: Skor&#233; osetrenie porastov obiln&#237;n sa odpor&#250;ca vykonat na zaciatku v&#253;skytu choroby a za predpokladu skor&#233;ho n&#225;stupu siln&#233;ho infekcn&#233;ho tlaku. Psenicu osetrujte vo f&#225;ze plne vyvinut&#233;ho vlajkov&#233;ho listu az do f&#225;zy ...

Adjuvant vo forme emulgovatel&#233;ho koncentr&#225;tu urcen&#253; na zlep&#237;enie vlastnost&#237; postrekov&#253;ch kvapal&#237;n, zv&#253;senie a zr&#253;chlenie penetr&#225;cie pr&#237;pravkov do rastl&#237;n a zv&#253;senie biologickej &#250;cinnosti pestic&#237;dov, ...

ADAMA Global SK sk. Slovak; Profil spolocnosti. ADAMA Agricultural Solutions Ltd. (v minulosti Makhteshim Agan Industries Ltd.) patr&#237; medzi popred&#253;ch svetov&#253;ch v&#253;robcov a distrib&#250;torov u&#237;itoc&#253;ch riesen&#237; v ochrane rastl&#237;n. ...

Aj ked je GOLTIX GOLD vysoko selekt&#237;vny cukrovej repe, pri TM s kombinovan&#253;mi pr&#237;pravkami dodrzujte z&#225;sady platn&#233; pre ich aplik&#225;ciu. GOLTIX GOLD je selekt&#237;vny, nebola zaznamenan&#225; odrodov&#225;citlivost, avsak pri TM kombin&#225;cii s in&#253;mi herbic&#237;dmi m&#244;ze za negat&#237;vnych klimatick&#253;ch podmienok (ako napr. mr&#225;z, extr&#233;mne v&#253;kyvy tepl&#244;t) d&#244;jst ...

Proti piliarke repkovej a skock&#225;m osetrujte od vzch&#225;dzania do konca okt&#243;bra. Prv&#233; osetrenie proti blysk&#225;cikovi vykonajte na zaciatku predlzovacieho rastu, kedy z&#225;klad kvetenstva je kryt&#253; zelen&#253;mi l&#237;stkami a rastliny s&#250; asi 20 cm vysok&#233;, pricom s&#250;s&#250;casne nicen&#233; aj krytonosy. Dalej osetrujeme v obdob&#237; objavovania sa prv&#253;ch p&#250;cikov na okrajoch kvetenstva ...

MAVRIK je kontaktn&#253; insektic&#237;d vo forme vodnej emulzie typu olej - voda urcen&#253; na nicenie cicav&#253;ch a zrav&#253;ch skodcov v chmeli, poln&#253;ch plodin&#225;ch, zelenine, zemiakoch, vinici a v ovocn&#253;ch kult&#250;rach s minoritnou regictr&#225;ciou v repe cukrovej, s&#243;ji, jahod&#225;ch, jadrov&#225;ch a ...

Pr&#237;pravok aplikujte od f&#225;zy zaciatku predlzovacieho rastu az po pln&#233; klasenie obiln&#237;n (BBCH 30 - 55), v z&#225;vislosti od v&#253;skytu a intenzity chor&#244;b, v d&#225;vke 0,75 l/ha s&#243;lo alebo 0,4 l/ha v TM s azolov&#253;mi pr&#237;pravkami, s ktor&#253;mi vykazuje

synergick&#253; efekt ...

Proti piliarke repkovej a skock&#225;m osetrujte od vzch&#225;dzania do konca okt&#243;bra.Prv&#233; osetrenie proti blysk&#225;cikovi vykonajte na zaciatku predlzovacieho rastu, kedy z&#225;klad kvetenstva je kryt&#253; zelen&#253;mi l&#237;stkami a ...

V pr&#237;pade siln&#233;ho v&#253;skytu tr&#225;vovit&#253;ch bur&#237;n odpor&#250;came do TM alebo n&#225;sledne aplikovat Nicogan 40 OD v d&#225;vke 1 l/ha. V pr&#237;pade v&#253;skytu p&#253;ru plaziv&#233;ho aplikujte Nicogan 40 OD v d&#225;vke 1,5 l/ha.

Pestovanie hlavn&#253;ch polnohospod&#225;rskych plod&#237;n ako s&#250;obilniny, cukrov&#225;repa, kukurica, hrach atd. ako n&#225;sledn&#253;ch plod&#237;n v norm&#225;lnom osevnom slede po repke ozimnej osetrenej pr&#237;pravkom Sultan Top je mozn&#233; bez obmedzenia.. V pr&#237;pade potreby predcasnej zaor&#225;vky repky, m&#244;ze byt bez obmedzenia znovu osiata repka ozimn&#225;. Ozimn&#233;obilniny m&#244;zu ...

Osetrenia fungic&#237;dom PROTON je mozn&#233; realizovat v r&#225;mci sirok&#233;ho aplikacn&#233;ho intervalu.Vzhľadom na spektrum &#250;cinnosti a fyziologick&#233; p&#244;sobenie pr&#237;pravku je vsak optim&#225;lne PROTON pouzitie najm&#228; na ochranu posledn&#233;ho resp. predposledn&#233;ho listu az do f&#225;zy kvitnutia proti fuzari&#243;zam t.j. BBCH 37 - 65.Napriek tomu, ze tento pr&#237;pravok vykazuje v&#253;born&#250; ...

Adjuvant GROUNDED sa pouz&#237;va s autorizovan&#253;mi pr&#237;pravkami na ochranu rastl&#237;n v s&#250;lade so schv&#225;len&#253;mi podmienkami pre ich pouzitie. Pouz&#237;va sa v nasleduj&#250;cich plodin&#225;ch do uveden&#233;ho v&#253;vojov&#233;ho st&#225;dia plodiny so vsetk&#253;mi schv&#225;len&#253;mi pr&#237;pravkami na ochranu rastl&#237;n do ich plnej autorizovanej d&#225;vky.

PENDIGAN aplikujte do 2 dn&#237; po sejbe na dobre pripraven&#250; p&#244;du bez hr&#250;d.PENDIGAN m&#244;zete tiež aplikovat POST-emergentne po vz&#237;den&#237;ozimn&#253;ch obiln&#237;n (BBCH 13), kedy sa metlicka obycajn&#225;nach&#225;dza maxim&#225;lne v rastovej f&#225;ze 1 - 2 listov (BBCH 11-12).. Pri predpokladanom v&#253;skyte psiarky rolnej, lipkavca obycajn&#233;ho a parumanceka nevonav&#233;ho ...

Status je pr&#237;pravok, ktor&#253;m rastlinu z&#225;roven stimuluje k vyssiemu v&#253;konu fotosynt&#233;zy a t&#253;m vyssiemu ukladaniu asimil&#225;tov a z&#225;roven na lepsie vyuzitie dus&#237;ka. Tento synergick&#253; efekt sa vzdy prejav&#237;, a to aj v ...

V pr&#237;pade predcasnej likvid&#225;cie obilniny osetrenej pr&#237;pravkom Trimmer je mozn&#233; ako n&#225;hradn&#250; plodinu vysievať iba obilninu.. Riziko pestovania n&#225;sledn&#253;ch plod&#237;n je prijatel&#233; pri dodrzan&#237;nasledovn&#253;ch podmienok: - po 60 ...

Adjuvant vo forme kvapaln&#233;ho koncentr&#225;tu pre riedenie vodou pre pouzitie v polnohospod&#225;rstve, z&#225;hradn&#237;ctve a v lesn&#237;ctve. Je urcen&#253; pre zlepšenie vlastnost&#237; postrekov&#253;ch kvapal&#237;n, zn&#237;zenie &#250;letu pri aplik&#225;cii, rovnomern&#233;mu pokrytiu osetrovan&#233;ho povrchu a zlepšenie biologickej &#250;cinnosti pestic&#237;dov, predovsetk&#253;m kontaktn&#253;ch fungic&#237;dov a pr&#237;pravkov na b&#225;ze ...

Neosetrujte plodiny poskoden&#233; škodcami, chorobami, alebo stresovan&#233; nedostatkom ziv&#237;n. Pr&#237;pravok taktiez neaplikujte na vlhk&#253; porast pri teplot&#225;ch nizs&#237;ch ako 12 &#176;C, resp. vyss&#237;ch ako 25 &#176;C, dalej na v&#253;razne zaburinen&#253;ch ploch&#225;ch, ak neboli pouzit&#233; pr&#237;pravky proti burin&#225;m, pretože skr&#225;tenie stebiel m&#244;ze vytvorit dobr&#233; podmienky pre rozvoj bur&#237;n.

ADAMA Global SK sk. Slovak; Modern&#233; otroctvo. Nase pravidl&#225; t&#253;kaj&#250;ce sa otroctva a obchodovania s ludmi. ADAMA sa zaviazala chr&#225;nit ludsk&#233; pr&#225;va. Na t&#250;hodnotu kladieme velk&#253; d&#244;raz a povazujeme ju za z&#225;kladn&#253; kamen nasich aktiv&#237;t. Okrem toho investujeme velk&#233; &#250;silie do identifik&#225;cie a obchodovania s partnermi, ktor&#237; ...

Vo vinici osetrujte na z&#225;klade signaliz&#225;cie od rastovej f&#225;zy vyvinut&#233;ho stvrt&#233;ho listu (BBCH 14) do rastovej f&#225;zy zaciatok dozrievania (BBCH 81). Aplikacn&#250;d&#225;vku a objem vody odpor&#250;came prisp&#244;sobit rastovej f&#225;ze ...

Osetrenia fungic&#237;dom Slape Trio je mozn&#233; realizovat v r&#225;mci sirok&#233;ho aplikacn&#233;ho intervalu. Vzhľadom na spektrum &#250;cinnosti a fyziologick&#233; p&#244;sobenie pr&#237;pravku je vsak optim&#225;lne Slape Trio pouzit najm&#228; na ochranu posledn&#233;ho resp. predposledn&#233;ho listu. Napriek tomu, ze tento pr&#237;pravok vykazuje v&#253;born&#250;kurat&#237;vnu a eradikat&#237;vnu &#250;cinnost, t&#250;to jeho ...

Web: <https://www.kindanewdecor.co.za>

